25 años anticipando el futuro

CSL Seqirus

VI ENCUESTA DE OPINIÓN Y PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE LA ENFERMEDAD DE LA GRIPE

Informe

30 / 09 / 2026

gad3.com

ÍNDICE

00 METODOLOGÍA

01 GRUPOS DE RIESGO

02 VALORACIÓN E INTENCIÓN DE VACUNACIÓN

03 CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA GRIPE

04 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN

05 PERFIL

METODOLOGÍA

00

Metodología

Ficha Técnica

UNIVERSO

Población mayor de 18 años residente en España

TAMAÑO DE LA MUESTRA

3.003 entrevistas

ÁMBITO GEOGRÁFICO

Nacional

ERROR MUESTRAL

± 7,1% (n=200), ± 5,8% (n=300), ± 1,8% (n=3.003), para un grado de confianza del 95,5% (dos sigmas) y en la hipótesis más desfavorable de P=Q=0,5 en el supuesto de muestreo aleatorio simple.

CUOTAS

Elaborado por GAD3 y validado por Seqirus

DURACIÓN DE LA ENTREVISTA

4-5 minutos aproximadamente.

PROCEDIMIENTO DE LA RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN

Entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI)

FECHAS DEL TRABAJO DE CAMPO


Septiembre de 2026.

GRUPOS DE RIESGO

01

01.1 Conocimiento de los grupos de riesgo

Los mayores de 60 años siguen siendo, con diferencia, el grupo de riesgo más mencionado espontáneamente (89%), en niveles muy similares a 2025 (88%). Aumentan las menciones de los niños de 6 meses a 5 años (del 24% al 29%), de las patologías respiratorias (del 27% al 30%) y de otras patologías crónicas o inmunodeprimidas (del 28% al 30%).




A nivel sanitario, ¿sabría mencionar alguno de los denominados grupos de riesgo susceptibles de ser vacunados de gripe? *Multirrespuesta*


n=3.003

01.2 Pertenencia grupos de riesgo

Uno de cada tres españoles afirma pertenecer a un grupo de riesgo (33%), un porcentaje prácticamente estable respecto a 2025 (32%). La pertenencia se concentra especialmente entre las personas de 60 años o más (66%), frente a porcentajes de entre el 11% y el 21% en los tramos de menor edad.



% de Sí por Comunidad Autónoma




¿Pertenece Ud. a algún grupo de riesgo?

n=3.003

01.3 Pertenencia grupos de riesgo

Entre quienes se consideran población de riesgo, el grupo de mayores de 60 años continúa siendo el más señalado, aunque pierde peso respecto a 2025 (50% frente al 56%). Ganan presencia las patologías respiratorias (del 14% al 17%) y los profesionales sanitarios (del 5% al 8%), mientras que las patologías crónicas o inmunodeprimidas se mantienen estables en torno al 10%.




¿A qué tipo de grupo? *Multirrespuesta*

n= 1.110

01.3 Pertenencia grupos de riesgo

El tipo de grupo de riesgo al que se pertenece varía según la edad. Entre los mayores de 60 años predomina la propia edad (79%), mientras que entre los 45 y 59 años destacan las patologías respiratorias (31%), las crónicas (19%) y los profesionales sanitarios (18%). Entre los 18 y 29 años, los perfiles más frecuentes son los trabajadores esenciales (24%), los profesionales sanitarios (20%) y la inmunosupresión (19%).





¿A qué tipo de grupo? *Multirrespuesta*

n=1.110

01.4 Nivel de vacunación previo

La vacunación anual frente a la gripe se mantiene estable respecto a 2025 (32%), mientras que desciende ligeramente el porcentaje que no se ha vacunado en los últimos años (49%, frente al 52%). La vacunación anual es especialmente habitual entre los mayores de 60 años (61%) y los grupos de riesgo (66%), frente al 16% de la población no de riesgo.





En los últimos años, ¿se ha vacunado Ud. de la gripe en alguna ocasión?

n=3.003

01.5 Motivos por los que decidió vacunarse

Entre quienes se han vacunado, la protección propia o del entorno refuerza su posición como principal motivo (59%, frente al 55% en 2025). La recomendación de un profesional sanitario se mantiene como segundo factor, aunque desciende ligeramente (44% frente al 46%). También ganan peso la prevención de la propagación del virus (14%) y la oferta de la vacuna en el lugar de trabajo o estudios (13%).




Dígame por qué motivos decidió Ud. vacunarse *(Señalar máximo 3 opciones de respuesta)*

** Se incluye únicamente la comparativa con 2025, al haberse añadido nuevas categorías de respuesta desde ese año.*

n=1.514

01.6 Motivos por los que decidió no vacunarse

Entre quienes no se han vacunado, gana peso no considerarse parte de un grupo de riesgo, que pasa del 42% en 2025 al 48% en 2026. Le siguen no haber recibido prescripción (32%) y no haber padecido nunca la gripe (23%). Por el contrario, disminuyen las dudas sobre la efectividad de la vacuna, del 12% al 8%.




De los siguientes motivos, ¿cuáles consideró más relevantes de cara a decidir NO vacunarse? *(Señalar máximo 3 opciones de respuesta)*


** Se incluye únicamente la comparativa con 2025, al haberse añadido nuevas categorías de respuesta desde ese año.*

n=1.481

01.7 Retraso o rechazo de la vacuna

En el conjunto de la población, el 78% afirma haber seguido siempre las recomendaciones de vacunación. Un 16% señala haber decidido no administrar alguna vacuna recomendada y un 3% adicional declara que se han dado tanto episodios de retraso o duda como de rechazo. En conjunto, alrededor de dos de cada diez personas han retrasado, dudado o rechazado alguna vacuna recomendada.





Pensando no solo en la gripe, sino también en cualquier otra vacuna, ¿alguna vez ha retrasado o rechazado una vacuna recomendada para usted o para algún familiar a su cargo?


n=3.003


VALORACIÓN E INTENCIÓN DE VACUNACIÓN


02

02.1 Intención de vacunarse este año

La intención de vacunarse frente a la gripe se mantiene prácticamente estable respecto a 2025 (45% en ambos años). La disposición es mucho mayor entre las personas de 60 años o más (67%) y, especialmente, entre quienes pertenecen a grupos de riesgo (75%), frente al 30% de la población no de riesgo.








De cara a la próxima campaña de vacunación sobre la gripe, ¿tiene intención de vacunarse?

n=3.003

02.2 Motivos para decidir vacunarse

La protección frente a los virus continúa siendo el principal motivo para vacunarse (62%), en niveles similares a 2025 (60%). Gana peso la responsabilidad social, que pasa del 37% al 42%, así como la percepción de que es necesario vacunarse cada año frente a la gripe (del 32% al 34%). La confianza general en las vacunas se mantiene estable en torno a una cuarta parte.




De los siguientes motivos, ¿cuál es más relevante de cara a decidir vacunarse? (Señalar máximo 3 opciones de respuesta)

n=1.364

02.3 Motivos para decidir no vacunarse

Entre quienes no tienen intención de vacunarse, aumenta claramente el peso de no considerarse parte de un grupo de riesgo, del 53% en 2025 al 64% en 2026. Pierden peso, en cambio, la ausencia de recomendación o prescripción de un profesional sanitario (del 28% al 26%) y la consideración de que la gripe no es un virus grave (del 17% al 12%).




De los siguientes motivos, ¿cuál es más relevante de cara a decidir NO vacunarse? (Señalar máximo 3 opciones de respuesta)

** Se incluye únicamente la comparativa con 2025, al haberse añadido nuevas categorías de respuesta desde ese año.*

n=1.515

02.4 Factores para cambiar de opinión

La recomendación de un profesional sanitario refuerza su papel como principal factor capaz de hacer cambiar de opinión a quienes no tienen intención de vacunarse, pasando del 43% en 2025 al 56% en 2026. El resto de motivos se sitúa a bastante distancia y, además, disminuye el porcentaje que afirma que nada le haría cambiar de opinión, del 15% al 10%.





Si no tiene intención de vacunarse en el futuro, ¿qué factores podrían hacerle cambiar de opinión? (Señalar máximo 3 opciones de respuesta)


n=1.515

02.5 Conocimiento de la vacuna para mayores

El conocimiento sobre la existencia de una vacuna específica para mayores sigue siendo reducido: solo un 13% afirma conocerla. El porcentaje es inferior al registrado en 2024 (17%), mientras que se mantiene en los mismos valores que en 2025. Las diferencias por edad o pertenencia a grupos de riesgo son reducidas.







¿Sabe si existe una vacuna específica para mayores?


n=3.003

CONOCIMIENTO Y PERCEPCIÓN DE LA GRIPE

03

03.1 Afirmaciones respecto a la gripe

El conocimiento mejora claramente en varias afirmaciones respecto a 2025, especialmente en que haberse vacunado el año anterior no garantiza estar protegido este año y en distinguir la gripe de un catarro. En 2026, el acierto supera el 88% en las principales afirmaciones, aunque baja al 66% sobre si una persona vacunada puede contagiar y al 63% sobre si vacunarse evita contraer la enfermedad. Además, solo un 44% acierta sobre si la vacuna puede producir gripe.




Con relación a las siguientes afirmaciones relativas a la gripe y su vacuna, dígame si cree que son ciertas o erróneas.

n= 3.003

03.2 Complicaciones/consecuencias de la gripe

La neumonía y otras complicaciones respiratorias son, con diferencia, la consecuencia grave de la gripe más mencionada espontáneamente (64%). A bastante distancia se sitúan el fallecimiento (21%), la hospitalización (18%) y el empeoramiento de enfermedades crónicas (12%). Un 16% no sabe mencionar ninguna complicación concreta.




Más allá de los síntomas habituales, ¿qué complicaciones o consecuencias graves cree que puede llegar a tener la gripe? Respuesta múltiple

n= 3.003

03.2 Complicaciones/consecuencias de la gripe

La neumonía u otras complicaciones respiratorias son la consecuencia más mencionada espontáneamente en todos los grupos de edad, con un máximo entre los 30 y 44 años (72%) y un mínimo entre los 18 y 29 (53%). Entre los más jóvenes se registra además el mayor porcentaje de NS/NC (24%).




Más allá de los síntomas habituales, ¿qué complicaciones o consecuencias graves cree que puede llegar a tener la gripe? Respuesta múltiple

n= 3.003

03.2 Complicaciones/consecuencias de la gripe

La población perteneciente a grupos de riesgo menciona en mayor medida varias de las posibles consecuencias graves de la gripe. Las diferencias son especialmente visibles en el fallecimiento (25% frente al 19%), el empeoramiento de enfermedades crónicas (16% frente al 11%) y los problemas cardiovasculares (11% frente al 6%).





Más allá de los síntomas habituales, ¿qué complicaciones o consecuencias graves cree que puede llegar a tener la gripe? Respuesta múltiple

n= 3.003

03.3 Hospitalizaciones como problema para el sistema sanitario español

El 77% de los españoles considera que las hospitalizaciones causadas cada año por la gripe suponen mucho o bastante problema para el sistema sanitario. Esta percepción alcanza el 81% entre las personas de 45 a 59 años y el 80% entre los grupos de riesgo, frente al 70% entre los más jóvenes.






En su opinión, ¿hasta qué punto las hospitalizaciones causadas cada año por la gripe suponen un problema para el sistema sanitario español?

n= 3.003

03.4 Nivel de confianza en canales de comunicación sobre vacunas

El médico de Atención Primaria es, con diferencia, la fuente que genera mayor confianza para informarse sobre vacunas (81%). A gran distancia se sitúan los médicos especialistas (29%), enfermería (18%) y el Ministerio de Sanidad (16%). Los medios de comunicación y los familiares son citados por alrededor del 3%, y las redes sociales por apenas un 2%.




¿En cuáles de estas fuentes confía más para informarse sobre vacunas? Respuestas múltiples

n= 3.003

03.4 Nivel de confianza en canales de comunicación sobre vacunas

El personal sanitario concentra la confianza tanto entre los grupos de riesgo como entre la población no de riesgo. Entre los primeros es algo mayor la confianza en Atención Primaria (82% frente al 80%), especialistas (31% frente al 28%) y enfermería (20% frente al 18%), mientras que el Ministerio de Sanidad obtiene mayor confianza entre la población no de riesgo (17% frente al 13%).




¿En cuáles de estas fuentes confía más para informarse sobre vacunas? Respuestas múltiples

n= 3.003

03.4 Nivel de confianza en canales de comunicación sobre vacunas

La confianza en el médico de Atención Primaria aumenta con la edad, desde el 72% entre los 18 y 29 años hasta el 86% entre los mayores de 60. En cambio, entre los más jóvenes adquieren mayor peso los médicos especialistas (37%), el Ministerio de Sanidad (19%) y las sociedades científicas (11%).




¿En cuáles de estas fuentes confía más para informarse sobre vacunas? Respuestas múltiples

n= 3.003

03.5 Apoyo a las vacunas del entorno más cercano

Seis de cada diez españoles perciben que en su entorno cercano predomina el apoyo a la vacunación (61%), mientras que un 29% considera que las opiniones están muy divididas y un 9% que predominan las dudas o la desconfianza. Las diferencias entre población de riesgo y no de riesgo son reducidas.




En su entorno cercano, como familiares y amigos, ¿cómo diría que es la actitud hacia la vacunación?

n= 3.003

03.6 Afirmaciones sobre la seguridad, eficacia y recomendaciones

El 38% de los españoles muestra acuerdo con la afirmación de que a la población se le oculta o manipula información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas. El acuerdo es mayor entre los 18 y 29 años (44%) y entre la población no perteneciente a grupos de riesgo (42%), y menor entre los mayores de 60 años (33%) y los grupos de riesgo (31%).




Y, ¿en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las vacunas?: “A la población se le oculta o manipula información sobre la seguridad y eficacia de las vacunas”

n= 3.003

03.6 Afirmaciones sobre la seguridad, eficacia y recomendaciones

El 44% de la población muestra acuerdo con que las decisiones de las autoridades sobre la introducción o recomendación de nuevas vacunas están influidas por intereses políticos. Esta opinión alcanza el 50% entre los 30 y 44 años y es más frecuente entre la población no de riesgo (47%) que entre los grupos de riesgo (36%). Entre los mayores de 60 años, el acuerdo se reduce al 37%.



Y, ¿en qué medida está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las vacunas?: “Las decisiones de las autoridades sobre la introducción o recomendación de nuevas vacunas están influidas por intereses políticos”


n= 3.003


INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN


04

04.1 Campaña de vacunación

Tres de cada diez españoles afirman haber recibido información sobre la campaña de vacunación de la gripe en el último año (30%), un porcentaje prácticamente idéntico al de 2025. Por edad, la recepción es mayor entre las personas de 30 a 44 años (36%) y menor entre los mayores de 60 (27%). Apenas existen diferencias entre la población de riesgo y la no perteneciente a estos grupos (30% en ambos casos).








A lo largo del último año, ¿ha recibido algún tipo de información sobre la campaña de vacunación de la gripe?

n=3.003

04.2 Medio de información

El centro de salud u hospital continúa siendo el principal canal por el que se recibe información sobre la campaña, aunque desciende del 40% en 2025 al 32% en 2026. En cambio, ganan peso el centro de trabajo (del 15% al 17%), el personal sanitario (del 9% al 16%) y los recordatorios por SMS o correo electrónico (del 5% al 9%), mientras que los medios de comunicación descienden del 22% al 18%.




Y, ¿a través de qué medio ha recibido dicha información?

**En 2025, se sustituye el término "Administración pública / Sistema Público de Salud" por "En mi centro de salud/hospital". Y se añade la opción "A través de un recordatorio por SMS o correo electrónico.*

n=939

04.2 Medio de información

El centro de salud u hospital es el principal canal de información en todos los territorios, con los valores más altos en Castilla-La Mancha (44%) y Baleares (37%). Como rasgos diferenciales, destaca el peso del centro de trabajo en Castilla y León (28%) y Madrid (25%), de los medios de comunicación en Canarias (25%) y de los recordatorios por SMS o correo electrónico en la Comunidad Valenciana y el País Vasco (18% en ambos casos).




Y, ¿a través de qué medio ha recibido dicha información?

n=939

04.3 Información sobre la vacuna

Más de la mitad de los españoles preferiría que su médico o personal de enfermería le informara con mayor insistencia sobre la importancia de la vacunación antigripal (51%). A distancia se sitúan los recordatorios por SMS (29%) y los programas educativos en radio o televisión (26%). Un 11% señala que no quiere recibir información.




¿De qué modo o forma le gustaría a Ud. que le informaran sobre la importancia de la vacunación antigripal?

n=3.003


PERFIL DE LA MUESTRA

05


Sexo




Edad
Media: 45



Situación laboral



Nivel de estudios



n=3.003

25GAD3

25 años anticipando el futuro